


**PESTA PORCINĂ AFRICANĂ**  
**Extras privind acțiunile de combatere a PPA**



# ATENȚIE!

## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

- VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA OMULUI!
- NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST VIRUS!
- VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 100%!!
- PORCUL CONTAMINAT MOARE SIGURI!


# ATENȚIE!

## PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

Virusul rezistă:


- 6-10 zile în fecalele de porc;
- 10 săptămâni în cadavre;
- 3-6 luni în carnea sărată și afumată;
- 6-12 luni în corpul căpușelor din genul Ornithodoros;
- 18 luni în sânge la temperatura de 4°C;
- 6 ani în sângele congelat;
- Peste doi ani în carnea congelată.

# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ




**MOARTEA SURVINE ÎN 10 ZILE**


# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ



# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

## ACȚIUNI PREVENTIVE



Convocarea primarilor și informarea autorităților locale cu privire la riscuri

Măsuri de informare la nivel de prefectură, primării și consiliile locale


Distribuirea de pliante către toți deținătorii de porci

Activitate de informare și prevenție activă desfășurată de către medicii veterinari






# COMBATERE PPA (organizare)



# COMBATERE PPA (organizare locală)



## MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE A PPA

- toate porcinele din exploatație vor fi ucise fără întârziere, sub control oficial și într-o manieră care să evite riscul propagării virusului PPA;
- se prelevează un număr suficient de probe, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploatație și perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploatație înainte de notificarea bolii;
- carcasele porcilor morți sau uciși trebuie să fie procesate/distrușe sub supraveghere oficială;
- materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploatație în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatație și adoptarea măsurilor oficiale să fie marcate și distruse sub supraveghere oficială;
- orice substanță sau deșeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, așternutul, să fie supuse procesării; toate materialele de unică folosință care pot fi contaminate și, în special, cele utilizate pentru operațiunile de ucidere, să fie distruse;
- după uciderea porcilor, adăposturile și vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum și echipamentul, trebuie dezinfectate, iar așternutul pentru animale, gunoii de grajd și purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie distruse;

# UITĂ-TE ȘI ANUNȚĂ!

**AI OBSERVAT LA  
PORC**

Pete roșii albaștrui pe  
piele, în special în zona  
urechilor și a râtului

Respirație îngreunată

Febră mare

Lipsă pofță de mâncare

Apatie

**ANUNȚĂ MEDICUL  
VETERINAR!**

**ATENȚIE!**

**UITĂ-TE ȘI ANUNȚĂ !**

**AI VĂZUT VREUN CADAVRU  
DE ANIMAL ?**



**ANUNȚĂ MEDICUL  
VETERINARI !**

**ATENȚIE !**

**ATENȚIE !**

**PORȚUL SE UȚIDE DOAR SUB  
SUPRAVEGHEREA MEDICULUI VETERINAR !**

**ATENȚIE !**

**CONTACTAȚI IMEDIAT MEDICUL VETERINAR  
DACA VEDEȚI UN CADAVRU DE MISTREȚ !**



**ATENȚIE !**

**NU DEPLASAȚI ANIMALELE DIN GOSPODĂRIE  
ȘI TINETI-LE ÎNCHISE !**



**ATENȚIE !**

**NU SACRIFICĂ ANIMALUL !**

**VEI PRIMI DESPĂGUBIRI !**

**ANUNȚĂ MEDICUL VETERINAR !**

**ATENȚIE !**

**NU CONSUMA CARNEA  
DE LA ANIMALUL CONTAMINAT !**